



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Rue Saint-Jean • B.P. 19 • 31131 BALMA CEDEX
Tél. Standard : 61.24.70.70 - Technique : 61.24.70.33
Abonnements : 61.24.70.30

Régisseur de Recettes
D.R.A.F. "MIDI-PYRENEES"
CCP : 8618-62 Y Toulouse
I.S.S.N. : 0752-2053

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ABONNEMENT ANNUEL 200 F.

BULLETIN N° 17 DU 17 OCTOBRE 1992

COLZA

PUCERONS ET VIROSES

La présence de pucerons est d'habitude observée sur colza. Les deux espèces principales sont :

- *Myzus persicae*, le puceron vert du pêcher,
- *Brevicoryne brassicae*, le puceron cendré du chou.

Ces pucerons occasionnent des dégâts directs par les prélèvements alimentaires de sève, mais peuvent transmettre également des viroses.

Une intervention est à envisager dès l'observation d'1 plante sur 5 porteuse de pucerons.

Situation

- En parcelles, il n'est pas actuellement observé de pucerons.
- Au piège en "bac jaune", quelques rares adultes de *Myzus persicae* sont capturés ces derniers jours.

Préconisation

Aucune intervention n'est à envisager.

Aditif au dernier bulletin (n° 16 du 2 octobre 1992)

A la rubrique "Antigraminées à action foliaire sur colza", remplacer la spécialité GALLANT par :

- ELOGE (DOW ELANCO, commercialisé par BAYER), à base de haloxyfop-éthoxyéthyl, à utiliser uniquement à l'automne aux doses de :
0,5 l/ha sur graminées annuelles
1 l/ha sur graminées vivaces et pâturins


CEREALES

JAUNISSE NANISANTE DE L'ORGE

Situation

Vol faible de *Rhopalosiphum padi*, vecteur de la jaunisse, qui ne permet pas de préjuger de la suite. Le retard dans la récolte des maïs et les nombreuses repousses liées aux parcelles non cultivées constituent autant de raisons de craindre un retour en force du problème cet automne dans les semis précoces.

intensité du vol de *Rhopalosiphum padi* en 1992



Vol à l'automne 1992